



Wechselwirkungen mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

Trichosan (*Trichoderma harzianum*) wird in seiner Wirksamkeit von Herbiziden und Insektiziden sowie von allen wasserlöslichen Düngern und Spurenelementen nicht negativ beeinflusst.

Folgende Fungizide können mit Trichosan kombiniert werden:

Apron 35SD

Benomyl (im Gegensatz zu anderen Trichoderma-Produkten!)

Dithane M45

Novozir MN80

Ronilan 50WP

Rovral 50WP

Sumilex 50WP

Sacrust

Pomarsol forte WP

Vitavex 200WP

Cabendazim (Derosal, Sportak, Alpha, Bavistin, Triticol)

Captan (Malvin, Merpan, Orthocid)

Metalaxyl (Fonganil NEU, Ridomil MZ, Ridomil TK, Ridomil Granulat

Thiabendazol

Alle anderen Fungizide können mit einer Karenzzeit von 14 Tagen vor und nach dem Einsatz von Trichosan eingesetzt werden.

Grundsätzlich gilt: Trichosan erst zuletzt zugeben, damit die Sporen nicht mit dem unverdünnten Pflanzenschutzmittel in Berührung kommen!

Beratung und Verkauf durch:



Rosenstr. 19 - 72119 Ammerbuch

Tel.07032/9578-30 Fax -50

E-Mail info@nuetzlinge.de www.nuetzlinge.de



diese Broschüre zum Downloaden unter:
www.nuetzlinge.de/download/trichosan-mischbarkeit.pdf

Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung. Vor Gebrauch des Präparats ist die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen und zu beachten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Produktion von Trichosan: Vitalin Pflanzengesundheit GmbH
Stand der Informationen März 2010
Für Druckfehler keine Haftung.